



STERİL MALZEME AÇMA TALİMATI

Doküman Kodu	AH.TL.10
Yayın Tarihi	10.10.2016
Revizyon Numarası	0
Revizyon Tarihi	0
Sayfa No	1 / 2

1.AMAÇ: KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Ameliyathanesinde cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesi amacıyla ameliyatta kullanılacak malzemelerin sterilitesinin bozulmadan açılması için gerekli kural ve uygulamalarda standart bir yöntem belirlemektir.

2.KAPSAM: Ameliyatta kullanılacak malzemelerin steril açılması için gerekli kural ve uygulamaları kapsar.

3.KISALTMALAR:

4.TANIMLAR:

5.SORUMLULAR: Enfeksiyon Kontrol Kurulu, ameliyathane sorumlu hemşiresi ameliyathanede çalışan tüm hemşireler ve ameliyathane teknisyenleri sorumludur.

6.FAALİYET AKIŞI

6.1.1. Hasta ameliyat odasına alınmadan önce steril malzemeler açılmamalıdır.

6.1.2. Steril paket veya malzeme açılmadan önce her paketin yırtık, delik ve ıslak olup olmadığı ve son kullanma tarihi hemşire tarafından kontrol edilmelidir.

6.1.3. Açılan steril malzemenin steril kalma güvenliği sağlanmalıdır.

6.1.4. Steril malzeme açılırken önce açan kişiden uzak taraf daha sonra yakın taraf açılmalıdır.

6.1.5. Malzemelerin sterilizesinden şüphe duyuluyorsa o malzeme steril kabul edilmemeli ve kullanılmamalıdır.

6.1.6. Kâğıt paketler yırtılarak açılmamalı, tekniğe uygun olarak açılmalıdır.

7. UYGULAMA

7.2.1. Bohça, konteyner, küvet ve diğer malzemeler ameliyathane personeli tarafından steril depodan alınır.

7.2.2. Konteyner üzerinde bulunan etiket bilgileri ameliyathane hemşireleri tarafından kontrol edilir ve ameliyat sonuna kadar saklanır.

7.2.3. Konteyner ve bohça enstrüman masasına, ameliyathane hemşiresi tarafından yerleştirilir.

7.2.4. Açmadan önce her paketin yırtık, delik ve ıslak olup olmadığı ve son kullanma tarihi hemşire tarafından kontrol edilir.

7.2.5. Ameliyathane hemşiresi tarafından. paketlerin önce kendisine uzak olan üst ucu tutulur ve arkaya doğru açılır.

7.2.6. Sonra dışta kalan ucu tutarak sağ yanı, diğer dış ucu tutarak sol yanı açılır.

7.2.7. En son kendine yakın olan tarafı açılır.

7.2.8. Bohça, küvet ve diğer malzemelerin içinde bulunan bohça içi indikatör ameliyat hemşiresi tarafından kontrol edilir.

Eğer indikatör görünmüyorsa cerrahi alet ile kontrol edilir.

7.2.9. Konteyner açılırken adı, üzerindeki buhar otoklavı maruziyet indikatörü ve etiket bilgileri (konteyneri kapatan kişinin adı, son kullanım tarihi) kontrol edilir.

7.2.10. Bisturi, sütür, spanç vb. malzemeler kontaminasyonu önlemek amacıyla küvetten 30-40 cm. uzaklıktan açılır.

7.2.11. Bu tür malzemeler açılırken steril paket iki elin bas parmak ve diğer parmakların desteği ile açma yerinden tutulur. Paket hiçbir yere değdirilmeden ve paket içine dokunulmadan küvetin içine veya masaya açılır.



STERİL MALZEME AÇMA TALİMATI

Doküman Kodu	AH.TL.10
Yayın Tarihi	10.10.2016
Revizyon Numarası	0
Revizyon Tarihi	0
Sayfa No	2 / 2

7.2.12. Steril eldiven paketi de aynı şekilde küvete yada bohça masasına steril tekniğe uygun olarak açılır. Eldivenler yırtılarak açılmamalı, steril tekniğe uygun olarak açılmalıdır.

7.2.13.çıkmayan paketler tekrar steril edilmesi için sterilizasyon ünitesine gönderilir.

7.2.14. Bohça tekrar kirli çamaşır sepetine atılır. Cerrahi aletler, küvet, tepsi gibi malzemeler sayılarak alet yıkama ünitesine götürülür.