



HEMORİD AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ

Doküman No	HD.RB.347
Yayın Tarihi	08.08.2017
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	0
Sayfa No	1 / 2

Sayın hastamız

Aşağıdaki açıklama formu size yapılacak işlemler hakkında bilgi verecektir. Sizi doktorunuz ile yapacağınız görüşmeye hazırlayacaktır. Sizinle sizin için en uygun olan tedavi metodu görüşülecek ve planlanan girişimin riskleri ve yan etkileri hakkında detaylı açıklama yapılacaktır. Takiben yapılacak işlemle ilgili olarak yazılı onamınız alınacaktır. Bu formu lütfen dikkatle okuyun. Sormak istediğiniz başka şeyler varsa sorun. Görevimiz size yardımcı olmaktır.

Bu işlemi Genel Cerrahi Uzman Doktoru ve araştırma görevlileri eşliğinde uygulayacaktır.

Bu işlemin tahmini süresi 20-25 dakikadır.

Bu işlemin yapılmaması durumunda neler olabilir?:

Tedavi uygulanmadığı takdirde ağrınız, şişliğiniz ve kanamanız sürekli olarak devam eder.

Bu işlemin faydaları nelerdir ?

Bu işlemten sonra hastanın ağrı , şişlik, kanama ve büyük abdestte zorlanma gibi şikayetleri ortadan kalkar.

Bu İşlemin Alternatifleri Nelerdir ?

Laser yöntemi , bantligasyon yöntemi , longo yöntemi gibi alternatif yöntemlerde mevcuttur.

Genel anestezinin riskleri nelerdir?

Modern anesteziye ciddi problemler nadirdir. Risk hiç yok denemez ancak modern araç gereçler, eğitim ve ilaçlar sayesinde son yıllarda anestezi daha güvenli hale gelmiştir. Risk, sizin diğer hastalıklarınıza, kişisel özelliklerinize(sigara içmek, kilolu olmak gibi) yada ameliyatın ne oranda komplike olduğuna, acil şartlarda yapılıp yapılmadığına bağlı olarak değişir.

Çok sık ve sık görülen yan etkiler: (1/10 veya 1/100 kişide): halsizlik, ameliyat sonrası kusma, boğaz ağrısı, baş dönmesi, kaşıntı, sırt ağrısı, ilaç enjeksiyonlarına bağlı ağrılar, konfüzyon, hafıza kaybı)

Daha nadir görülen yan etkiler ve komplikasyonlar: (1/1000): Göğüs enfeksiyonu, mesane problemleri, kas ağrıları, yavaş nefes alma (solunum depresyonu), diş, dil, dudak hasarı, ameliyat sırasında uyanma ve farkında olma, servikal vertebra(boyun omuru) kırığı ve çıkığı, nefes borusu veya bronş rüptürü, mide içeriğinin akciğere kaçması, bronkospazm, laringospazm(nefes almada güçlük), vokal kord paralizi(ses tellerinin felci).

Çok nadir komplikasyonlar(1/10000 veya 1/100000): göz hasarı, ciddi ilaç alerjisi, sinir hasarı, malign hipertermi, ölüm

Bölgesel (rejyonel) anestezi

Rejyonel anestezi epidural ve spinal anestezi olarak iki şekilde uygulanır. İkisi arasında teknik ve ilacın uygulandığı yer bakımından fark vardır. Rejyonel anestezi için, bir lokal anestetik ilaç omurga içindeki bir grup sinir köklerinin bulunduğu bölgeye enjekte edilir ve o bölge uyuşur. Ayrıca karın kasları da ilacın etkisiyle gevşer ve bu sayede ilgili ameliyat yapılabilir.

Bazen rejyonel anestezi, (sıklıkla epidural anestezi) özellikle majör cerrahiler için genel anesteziye sonra, ameliyat sonrası ağrıyı azaltmak amaçlı da kullanılır.

Rejyonel anestezi sonrası gelişebilecek komplikasyonlar nelerdir ?

- * Ağrılı enjeksiyon,
- * Sırt ağrısı, Baş ağrısı, Hipotansiyon,
- * İdrar yapmada güçlük,
- * Solunum sıkıntısı, Bulantı ve kusma,
- * Geçici veya kalıcı sinir hasarı,
- * Lokal anesteziklere karşı allerji,
- * Yüksek spinal anestezi, menenjit

Ameliyat ve sonrasında ilgili olabilecek riskler ve komplikasyonlar

1. Ameliyat sırasında ve sonrasında derin ven sisteminde oluşabilecek pıhtılar oradan koparak akciğer embolilerine yol açabilirler. Bu ameliyatta emboli riski pratik olarak yok denecek düzeyde olduğu için herhangi bir ilaç ile önlem alınmayacaktır.
2. Ameliyat sonrasında bağlanan damarlardan kanama gelişebilir ve tekrar ameliyata gerek duyulabilir.



HEMORÖİD AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ

Doküman No	HD.RB.347
Yayın Tarihi	08.08.2017
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	0
Sayfa No	2 / 2

- Ameliyatta makatı büzen kaslar zedelenebilir ve bu nedenle % 20 dolaylarında geçici (birkaç haftalık) hafif gaz ve/veya dışkı kaçırma, % 1-2 dolaylarında da kalıcı kaçırma riski söz konusu olabilir.
- Ameliyat bölgesinde infeksiyon gelişebilir ve en kötü durumda yaygın Fournier kangrenine ve ölüme yol açabilir. Kolostomi veya ileostomi yapılması gerekebilir. Makat işlevleri kalıcı olarak kaybedilebilir. Bu riskler % 1'in çok altındadır.
- Nadiren de olsa kanama, organ yetmezliği veya ölüm riski taşımaktadır.

Doktorum tarafından hastalığım ve bana yapılması planlanan tedavi konusunda detaylı olarak bilgilendirildim. Bunun yanında yapılacak müdahalenin şekli, şahsıma ait özel riskleri, yan etkileri ve gerekebilecek diğer girişimler hakkında benim için önemli olduğunu düşündüğüm bütün soruları sordum. Başka sorulacak hiçbir sorum yok. Kendimi yeteri kadar aydınlanmış hissediyorum ve yeteri kadar düşündükten sonra bana yapılması planlanan müdahale için rıza gösteriyorum. Gerekli olabilecek acil yöntem değişiklikleri için de rıza gösteriyorum. Bu iznim tıbbi zorunluluk nedeni ile gerekli kan ve kan ürünlerinin nakli için de geçerlidir.

BU AMELİYATIN BANA UYGULANMASINI KABUL EDİYORUM.

Hastanın Adı-Soyadı :İmzası:..... Tarih/saat:

(Hasta onay veremeyecek durumda ise)

Hasta vasisi/yakınının Adı Soyadı:.....İmzası:..... Tarih/saat:

(Yakınlığı:.....)

Doktor adı soyadı/unvanı imza :

Rızanın Alındığı Tarih/Saat: