



İTAKÎ II DÜŞME RİSKİ ÖLÇEĞİ

Doküman Kodu	HB.FR.04
Yayın Tarihi	21.01.2016
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	13.08.2021
Sayfa Numarası	1

Tarih:							Yaşı :						
Hastanın Adı Soyadı:							Yattığı Bölüm:						
Cinsiyeti:							Risk Değerlendirme Tarihi:						
Değerlendirme Gerekçesi ve Numarası	1	İlk Değerlendirme	2	Post-op Dönem	3	Hasta Düşmesi	4	Bölüm Değişikliği		5	Durum Değişikliği		
Parametreler	Risk Faktörleri						Puan	İlk Değerlendirme	Yeniden Değerlendirme (Tarih- Gerekçe Numarası)				
								.../.../... ()	.../.../... ()	.../.../... ()	.../.../... ()	.../.../... ()	.../.../... ()
YAŞ	60-69						1	1	1	1	1	1	
	70-79						2	2	2	2	2	2	
	80 ve üstü						3	3	3	3	3	3	
BİLİNÇ DURUMU	Bilinci kapalı.						1	1	1	1	1	1	
	Bilinç bozukluğu var (Konfüze, laterjik vb.)						2	2	2	2	2	2	
DÜŞME HİKAYESİ	Son 6 ay içerisinde düşme öyküsü var.						3	3	3	3	3	3	
HASTALIKLAR/KOMORBİDİTELER (Hipotansiyon, vertigo, serebrovasküler hastalık, parkinson hastalığı, uzuv kaybı, nöbet, artrit, osteoporoz, kırıklar)	Hastalıklarda n en fazla ikisi bulunmaktadır.						1	1	1	1	1	1	
	Hastalıklarda n 3 ve daha fazlası bulunmaktadır.						2	2	2	2	2	2	
HAREKET KABİLİYETİ	Ayakta/yürürken fiziksel desteğe (yürüteç, koltuk değneği, kişi desteği vb.) ihtiyacı var.						5	5	5	5	5	5	
	Ayakta/yürürken denge bozukluğu var.						10	10	10	10	10	10	
	Baş dönmesi var.						2	2	2	2	2	2	
BOŞALTIM İHTİYACI	Üriner/Fekal kontinans bozukluğu var.						1	1	1	1	1	1	
GÖRME DURUMU	Görme bozukluğu var (Katarakt, gözlük kullanımı vb.)						2	2	2	2	2	2	
	İleri derecede görme engeli var.						10	10	10	10	10	10	
İLAÇ KULLANIMI	4'den fazla ilaç kullanımı var.						2	2	2	2	2	2	
	Son 1 hafta içinde riskli en çok 2 ilaç kullanımı var.						2	2	2	2	2	2	
	Son 1 hafta içinde riskli 3 ve daha fazla ilaç kullanımı var.						3	3	3	3	3	3	
EKİPMAN KULLANIMI (Hastanın hareketini kısıtlayan herhangi bir ekipman. Örn: IV infüzyon, foley katater, göğüs tüpü vb.)	Hastaya bağlı 1-2 bakım ekipmanı var.						1	1	1	1	1	1	
	Hastaya bağlı 3 ve üstü bakım ekipmanı var.						2	2	2	2	2	2	
TOPLAM													

RİSK DÜZEYİ BELİRLEME TABLOSU											
Düşük Risk	0-9 Puan Arasında										
Yüksek Risk	10 Puan Üzerinde										

Değerlendirmeyi yapan Hemşire Adı-Soyadı:											
İmza:											

NOT: Düşmelerin önlenmesine yönelik alınacak önlemler hastada var olan risk faktörlerine göre belirlenmelidir.

* İtakî Düşme Riski Ölçeği yalnızca yetişkin yatan hastalarda kullanılır.

* Yüksek risk düzeyinde bulunan hastalar için "Düşme Risk Yüksek Hasta" sembolü kullanılmalıdır.