



**ULTRASONOĞRAFI EŞLİĞİNDE TİROİD
İNCE İĞNE ASPIRASYON BİYOPSİSİ (TİİAB)
BİLGİLENDİRME ve RIZA BELGESİ**

Doküman No	HD.RB.122
Yayın Tarihi	07.01.2016
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	0
Sayfa No	1/1

Biyopsi kimin tarafından yapılacağı: Endokrinoloji öğretim üyesi veya Endokrinoloji yan dal araştırma görevlisi tarafından yapılmaktadır.

Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinden Beklenen Faydalar ve Yapılmaması Durumunda Karşılaşılabilecek Sonuçlar

Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi tiroit nodüllerinde tiroid kanseri varlığını araştırmak için kullanılan bir yöntemdir. Tiroid nodülü tiroit bezinde çevresinden kıvamca farklı , yuvarlak veya oval kitlelerdir. Nodüller tek ya da çok sayıda olabilir. Sadece muayene ile toplumda 100 kişinin ortalama olarak 5'inde tiroid nodülü tespit edilmektedir. Ülkemizde bu oran çok daha yüksektir. Ultrasonoğrafi ile ise 100 kişinin yaklaşık 5-50'sinde tiroid nodülü tespit edilebilmektedir. Ülkemizde tiroid hastalıkları ve tiroid nodülleri yaygındır. Bu nedenle nodüllerde kanserin var olup olmadığını ayırt etmek için tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi önem taşımaktadır. Ultrasonoğrafi eşliğinde tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi nodülü olan herkese (10 mm'den küçük nodüllere bile yapılabilir)

Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Kimlere Yapılmaz?

Kanamaya eğilimi olan hastalara, bilinci yerinde olmayanlara ve belirgin psikolojik problemi olan hastalara yapılmaz.

Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Nasıl Yapılır ve İşlem Süresi?

Öncelikle işleme mutlaka tok karna geliniz. Biyopsi bir enjektör ucundaki ince bir iğne ile yapılmaktadır. Doktorunuzun uygun gördüğü nodüllerinizin her birine 2-4 defa işlem uygulanmaktadır. **İŞLEM SIRASINDA YUTKUNMAMANIZ ÖNEMLİDİR. İşlemin süresi 5-15 dk.'dır**

Biyopsinin Komplikasyonları ve Riskleri

Biyopsi sırasında hafif bir ağrı hissedebilirsiniz. İşlem sonrasında 24-48 saat boyunca yutkunurken boğazda ağrı hissi olabilir. Böyle bir durumda kan hastalığınız, mide rahatsızlığınız veya ilaç alerjiniz yoksa **ASPIRİN dışında** bir ağrı kesici kullanabilirsiniz.

Biyopsi sırasında nadir olmakla birlikte nodül içine veya dışına kanama olabilir. Kanamaya bağlı olarak boyunda şişlik gelişebilir. Bunların çoğu kanama alanına baskı uygulayarak kendiliğinden geçebilmektedir. Nadirinde olsa solunum yoluna bası varsa cerrahi işlem gerebilmektedir. Yine çok nadir komplikasyonlar biyopsi alanında enfeksiyon veya geçici ses kısıklığıdır. Böyle durumlarda mutlaka doktorunuzu bilgilendiriniz.

Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Patoloji Sonuçları

Biyopside alınan materyalin incelemesi: benign, malign, şüpheli veya tanı koymak için yetersiz olabilir. Yeteri kadar parça veya hücre gelmez ise (oran yaklaşık %2-20' dir) doktorunuzun önerisi doğrultusunda ikinci veya üçüncü defa biyopsi yapmak gerekebilir.

Hasta Onamı:

Hastanın Adı-Soyadı :İmzası:..... Tarih/saat:

(Hasta onay veremeyecek durumda ise)

Hasta vasisi/yakınının ;

Adı Soyadı:.....İmzası:..... Tarih/saat:

(Yakınlığı:.....)

Doktor adı soyadı unvanı :