



ÇOCUK CERRAHİSİ KLİNİĞİ SPLENEKTOMİ İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ

Doküman Kodu	HD.RB.55
Yayın Tarihi	21.12.2016
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	0
Sayfa No	1 / 3

PROTOKOL NO:

ADI SOYADI:

CİNSİYETİ: K E

BİLGİ

Doktor, çocuğuma aşağıdaki işlemin yapılacağını anlattı; Batında yapılan kesiden dalağın çıkarılması işlemi yapılacaktır. **Ameliyat yaklaşık olarak 3-4 saat sürebilir.** İşlem, aileden onam alan danışman doktorun dışında bir uzman hekim tarafından yapılabilir.

Hastalığınız hakkında bilmeniz gerekenler: Dalak; karın boşluğunun sol yan üst tarafında kaburgaların altında yerleşmiş, yetişkin insanda ortalama büyüklüğü normalde yumruk büyüklüğünde olan bir organdır. Mide, pankreas, sol böbrek, kalın barsak, yukarıda diyafragma adı verilen karın kası ile yakın komşuluktur. Dalak yaşlı, anormal kan hücrelerini ve kandaki bakteri adı verilen mikropları süzerek adeta bir filtre görevi görür. Ayrıca enfeksiyonlara karşı savaşta antikor üretiminde de görev olarak vücudun bağışıklık sistemini de güçlendirir. Ancak bazı kan hastalıklarında, karaciğer hastalıklarında olduğu gibi dalak normalden çok daha fazla kan hücrelerini süzerek, dolaşımdan kaldırır. Bu durum hastanın kansız kalmasına, vücutta çeşitli yerlerde çürüklerin oluşmasına, kanamalara yol açabilir. Ayrıca dalak büyüyebilir ve ağrılara yol açabilir. Bazen travma sonrası yaralanabilir ve hayatı tehdit edici kanamalar oluşabilir. Bazen de kist ya da tümör gelişebilir. Bu durumlarda dalağın tamamen ya da kısmen çıkarılması gerekir. Bu ameliyata splenektomi adı verilir. Bu ameliyat açık ya da laparoskopik (kapalı) yöntemle yapılabilir.

İşlemden beklenen faydalar nelerdir?

Dalak büyümesine neden olan kan hastalığı hayati organları etkiler ve ölüm görülebilir. Travma sonucu dalak alınmazsa kanama devam edebilir ve ölüm görülebilir. Bu durumların önlenmesi için dalağın alınması işlemden beklenen faydadır.

İşlemin yapılmaması durumunda neler olabilir: Hastalığınıza müdahale edilmediği takdirde hastalığınız ilerleyebilir. Yukarıda bahsedildiği gibi vücutta çeşitli yerlerde çürüklerin oluşmasına, kanamalara yol açabilir. Ayrıca dalak büyüyebilir ve ağrılara yol açabilir.

Nasıl bir tedavi/girişim uygulanacak: Tedavi cerrahidir.

Alternatif Yöntemler: Alternatif tedavisi deneyimli hekimlerce laparoskopik olarak dalağın alınmasıdır.

ANESTEZİNİN GENEL RİSKLERİ

Operasyon öncesi anestezi doktorları tarafından anestezinin risk ve komplikasyonları ile ilgili bilgi verilerek uzman doktor tarafından bilgilendirilmiş onam formunuz alınacaktır. Eğer konuyla ilgili bilgi verilmediyse mutlaka isteyin. Herhangi bir sorunuz olduğu takdirde hem operasyonu gerçekleştirecek doktorunuza hem de anestezi hekiminize istediğiniz soruyu sorabilirsiniz.

AMELİYAT ve TEDAVİNİN RİSKLERİ

Genel riskler şunlardır:

1. Ameliyat sonrası akciğerlerde küçük sahalarda çökmeler, akciğer enfeksiyonu gelişmesi ve bu nedenle antibiyotik kullanılması gerekebilir. Ayrıca dalağın çıkarıldığı (sol) tarafta akciğer zarları arasında su toplanması olabilir ve buna müdahale gerekebilir.
2. Anestezi sonrası solunum sıkıntısı gelişebilir ve bu nedenle yoğun bakım tedavisi gerekebilir.
3. Enfeksiyon gelişebilir.
4. Ölüm riski mevcuttur.

Bu ameliyata özel riskler ise şu şekildedir:

1. Ameliyat esnasında ana atardamar, toplardamar veya çalışılan bölgedeki diğer büyük damarlardan öldürücü kanamalar olması düşük bir olasılıktır.
2. Ameliyat sonrası karın içerisinde yapılan işlemlere bağlı büyük damarlardan kanama ve yeniden acil ameliyat gereksinimi.
3. Dalağın çok büyük olması nedeni ile ameliyat sonrasında o tarafa komşu sol göğüs içerisinde sıvı birikmesi, akciğerde kısmen çökme olması riski az da olsa mevcuttur.
4. Ameliyat esnasında pankreas iç bezi, kalın barsak, göğüs-karın zarı ve mideye çok yakın çalışıldığından bu organlarda yaralanma, sızıntı, periton zarı iltihabı ve pankreas bezi iltihabı oluşma riskleri mevcuttur. Bu riskler çok yüksek değildir.

